

Рентгенологическое исследование

Подготовка к исследованию

Исследование: обзорная урография

1. Накануне: - в 16⁰⁰, принять 40,0 г касторового масла
- вечером сделать 2 очистительные клизмы по 1,5 – 2,0 литра воды
2. В день исследования – 1 очистительная клизма утром.

Исследование: рентгеноскопия желудка

Исследование проводится до 14⁰⁰

1. Прийти натощак: не есть, не пить, не курить, лекарства не принимать
2. Принести простынь.

Исследование проводится после 14⁰⁰

3. До 9⁰⁰ утра – лёгкий завтрак (жидкая геркулесовая каша на воде или чай с булочкой), потом не есть, не пить, не курить, лекарства не принимать
4. Принести простынь.

Исследование: ирригоскопия

Вариант № 1. использование препарата **ФЛИТ (1 флакон)**

В день, накануне процедуры, во время обеда (14⁰⁰), легко перекусить. После обеда **нельзя** употреблять никакой твёрдой пищи. **Можно** пить чай с мёдом, сок, кисель, настой шиповника.

Вместо ужина (19⁰⁰) выпить стакан сока без мякоти или куриного бульона. В 19¹⁵ растворить содержимое 1 флакона **ФЛИТА** в половине стакана воды, выпить и запить одним стаканом воды.

Вариант № 2. использование препарата **ФОРТРАНС (3 пакета)**

За 2 – 3 дня до исследования нельзя употреблять: мясо, чёрный хлеб, свежие фрукты и овощи, зелень, фасоль, бобовые, грибы, ягоды, семечки, орехи, виноград. Можно: бульон, рыбу, сыр, печенье.

Накануне исследования, принять порошок ФОРТРАНС из расчёта: 1 пакет разводится в 1 литре тёплой кипяченой воды. Выпить 1 литр раствора в 4 приёма в течение часа (для улучшения вкуса можно добавить сок апельсина или лимона). Приём препарата производят в 15⁰⁰, в 16⁰⁰, в 17⁰⁰ (итого необходимо принять 2 – 3 литра жидкости). Слабительное действие порошка начнётся через час после его приёма. Вечером не ужинать.

Вариант № 3.

1. Накануне: - в 16⁰⁰ выпить 40,0 г. касторового масла

- затем сделать очистительные клизмы по 1,0 - 2,0 литра воды до чистых промывных вод (в 18⁰⁰, в 19⁰⁰, в 20⁰⁰)

2. В день исследования: сделать очистительные клизмы по 1,0 - 2,0 литра воды до чистых промывных вод (в 6⁰⁰, в 7⁰⁰)

На исследование пациент приносит:

- сменную обувь (тапочки),
- носки,
- ЖЕНЩИНЫ – халат, МУЖЧИНЫ – трико.

Эндоскопическое исследование

Рекомендации пациентам

1. Для выявления начальных стадий опухолей всем лицам старше 40 лет необходимо регулярно (1 раз в год) проходить профилактическое обследование желудочно-кишечного тракта: гастроскопию и ректороманоскопию. Колоноскопия проводится по показаниям, которые определяет лечащий доктор.
2. Особое внимание следует обратить пациентам группы риска по злокачественным опухолям желудочно-кишечного тракта. Это больные с хроническими формами гастрита, очаговыми гиперплазиями, полипами, язвами, а также лица с отягощенной наследственностью. В этих случаях исследование проводится 1-2 раза в год, а также при наличии соответствующих жалоб.
3. Если в толстом кишечнике выявлены доброкачественные опухоли (полипы), ранее проводилась операция на кишечнике по поводу злокачественных и доброкачественных новообразований, то контрольную колоноскопию следует выполнять 1 раз в год.

Подготовка на ФГС: голод до обследования 6-8 часов, с собой принести полотенце и медицинский полис.

Подготовка к колоноскопии и РРС: существует стандартная и индивидуальная подготовка, направленная на качественное очищение кишечника перед осмотром. Ту или иную подготовку в каждом конкретном случае выбирает и рекомендует врач-эндоскопист. Запись на эти виды обследования происходит в эндоскопическом отделении по направлению лечащего врача МУЗ "ГП №2".

Ультразвуковое исследование

Подготовка к УЗИ брюшной полости:

Накануне ужин в 18:00.

1. Исключить бобовые, черный хлеб, овощи, молоко – продукты, вызывающие газообразование.
2. Прием активированного угля или эспумизан.
3. В день исследования голод.
4. Взять с собой полотенце.